

ALLEGATO 1

PROCEDURE CHE I LAVORATORI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS

NEW OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37,5 °C) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA E L'AUTORITA'

NEW NON PERMANERE IN AZIENDA IN PRESENZA DI SINTOMI INFLUENZALI, PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO O ESSERE VENUTO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI; INFORMA IL DATORE DI LAVORO, IL TUO MEDICO E L'AUTORITA SANITARIA; MANTENITI DISTANTE DAGLI ALTRI LAVORATORI (almeno 1 Metro)

☞ **LAVATI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE PER ALMENO 60 SECONDI**

☞ **GARANTISCI SEMPRE UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA NEI LOCALI CONDIVISI** (si raccomanda di eseguire 2 ricambi d'aria al giorno per almeno 1 minuto non stando nel locale durante il ricambio)

☞ **PULISCI LE SUPERFICI CONDIVISE CON SOLUZIONI DISINFETTANTI** (si raccomanda di eseguire almeno 1 pulizia al termine del turno di lavoro della mattina e 1 pulizia al termine del turno di lavoro del pomeriggio; per la pulizia utilizzare comuni salviette di carta; smaltire le salviette utilizzate nel contenitore della carta)

☞ **NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI**

☞ **COPRITI NASO E BOCCA NELLA PIEGA DEL GOMITO SE STARNUTISCI O SE TOSSISCI E NON HAI A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO; EVITA IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE**

☞ **MANTENITI IN OGNI CONTATTO SOCIALE AD UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO (SE NON E' POSSIBILE MANTENERE IL METRO DI DISTANZA OCCORRE UTILIZZARE IDONEA MASCHERINA); EVITA ABBRACCI, STRETTE DI MANO E CONTATTI FISICI DIRETTI CON OGNI PERSONA;**

☞ **EVITA L'USO PROMISCOUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI**

☞ **ADOTTA OGNI ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DETTATA DAL DATORE DI LAVORO (ES. QUANDO UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO)**

OVE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA SI VENGA A CONTATTO CON UN SOGGETTO SOSPETTO (VEDI DEFINIZIONE DI SOGGETTO SOSPETTO PAGINA SUCCESSIVA) SI PROVVEDERA' DIRETTAMENTE A CONTATTARE I SERVIZI SANITARI SEGNALANDO CHE SI TRATTA DI CASO **SOSPETTO PER CORONAVIRUS**

NUMERI DI CHIAMATA TELEFONICA:
PRONTO SOCCORSO 118
NUMERO VERDE NAZIONALE 1500
NUMERO VERDE REGIONALE 800033033

NELL'ATTESA DELL'ARRIVO DEI SANITARI:

1. EVITARE CONTATTI RAVVICINATI CON LA PERSONA MALATA
2. SE DISPONIBILE, FORNIRLA DI UNA MASCHERA DI TIPO CHIRURGICO
3. LAVARSI ACCURATAMENTE LE MANI; PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SUPERFICI CORPOREE CHE SONO VENUTE EVENTUALMENTE IN CONTATTO CON I FLUIDI (SECREZIONI RESPIRATORIE, URINE, FECI) DEL MALATO
4. FAR ELIMINARE IN SACCHETTO IMPERMEABILE, DIRETTAMENTE DAL PAZIENTE, I FAZZOLETTI DI CARTA UTILIZZATI. IL SACCHETTO SARA' SMALTITO IN UNO CON I MATERIALI INFETTI PRODOTTISI DURANTE LE ATTIVITA' SANITARIE DEL PERSONALE SOCCORSO.

Caso sospetto è una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come "contatti stretti"

I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
- vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
- aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2

sono definiti "contatti stretti"

Per tali lavoratori da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, si provvede alla misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; **il lavoratore infatti in questi casi è tenuto a comunicare tale circostanza** il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale 800033033, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell' AUSL della Romagna (CESENA 0547 352079; FORLI' 0543 733585;

RAVENNA 0544 286671; RIMINI 0541 707290), nonché al proprio medico di medicina generale, segnalando il proprio stato di contatto stretto.

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei contatti stretti come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore che è in isolamento sia positivo al test SARS-CoV-2.

NEW GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

REGOLE PER LA DISINFEZIONE / LAVAGGIO DELLE MANI

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. **Se non sono disponibili acqua e sapone**, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)

LAVARSI LE MANI ELIMINA IL VIRUS

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MASCHERINA DI PROTEZIONE

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

NEW L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA **E' SEMPRE OBBLIGATORIO** SE NON RIESCI A MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO DALLE ALTRE PERSONE E se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti **oppure** se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

La mascherina una volta utilizzata va smaltita (le monouso); per quelle non monouso se la devi riutilizzare assicurati di non contaminare la parte interna della mascherina e conservala in un contenitore pulito; **una mascherina riutilizzata più volte aumenta il rischio di contrarre il virus**

COME DEVO METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA

Ecco come fare:

1. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
2. Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
3. Evita di toccare la mascherina mentre la porti; se la tocchi, lavati le mani
4. Quando diventa umida sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla;
5. Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore (il lato esterno); gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani

GUANTI DI PROTEZIONE

L'uso del guanto aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

L'utilizzo del guanto è obbligatorio per: personale sanitario, acconciatori estetisti, taxisti

L'utilizzo del guanto può essere necessario a seconda di particolari situazioni lavorative → segui le direttive aziendali

COSA UTILIZZARE PER PULIRE LE SUPERFICI

Periodicamente pulisci le superfici con cui vieni a contatto con le mani durante l'attività lavorativa e condivise con il pubblico (scrivanie, piani di lavoro). I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro solventi etanolo al 75% acido peracetico e cloroformio. Utilizza i preparati che hai in dotazione